




OBSERVATOIRE POPULATIONNEL

Définition :

- 1) Taux ajusté d'incidence par cancer colorectal pour 100 000 habitants : rapport pour une période donnée, du nombre de nouveaux cas de cancer colorectal, à la population totale au milieu de la même période, ajusté selon la structure de l'âge de la population.
- 2) Taux ajusté de mortalité par cancer colorectal, soit le rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par cancer colorectal pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Principales causes de mortalité (1995-1999 et 2000-2005) Taux ajusté de mortalité et incidence, cancer colorectal


Taux ajusté d'incidence du cancer colorectal (pour 100 000) selon le territoire, 1996-2000 et 2001-2005



Constat:

La comparaison du taux d'incidence et de mortalité par cancer colorectal révèle une létalité importante de ce type de cancer (comparativement au cancer de la prostate par exemple) compte tenu du fait que le taux d'incidence n'est qu'environ deux fois plus élevé que le taux de mortalité par cancer colorectal.

Évolution du taux ajusté de mortalité par cancer colorectal (pour 100 000) selon le territoire, 1995-1999 et 2000-2005



Taux ajusté d'incidence :

Au CSSS, pour la période 2001-2005, le taux ajusté d'incidence du cancer colorectal est plus élevé qu'à Montréal. C'est également le cas à Montréal-Nord, comparativement à Achunsiac.

Évolution entre les périodes :

L'évolution du taux ajusté d'incidence du cancer colorectal entre les périodes 1996-2000 et 2001-2005, révèle une hausse dans tous les territoires de comparaison, sauf Achunsiac. Toutefois, les différences ne sont pas significatives au seuil de 0,05, suggérant des taux relativement semblables entre les territoires de comparaison.

Taux ajusté de mortalité :

Le taux ajusté de mortalité par cancer colorectal durant la période 2000-2005 est supérieur au CSSSAM-N comparativement à Montréal. Il est également supérieur à Montréal-Nord comparativement à Achunsiac. Les taux ne sont cependant pas significativement différents au seuil de 0,05 suggérant que les taux se comparent entre les territoires de comparaison.

Évolution entre les périodes :

Entre les périodes 1995-1999 et 2000-2005, le taux ajusté de mortalité par cancer colorectal a augmenté dans tous les territoires de comparaison (Montréal, Montréal-Nord et Achunsiac). La hausse semble particulièrement élevée à Achunsiac.

Fiche : 103 : PCM_cancer_colorectal.

Source : Fichier des décès et fichier des tumeurs, MSSSS, Service de développement de l'information. Carrefour montréalais d'information sociosanitaire (CMIS), Atlas Santé Montréal, ASSS. Société canadienne du cancer, page Internet consultée le 11 juin 2010.

Note méthodologique : Les taux ont été ajustés à la structure d'âge du Québec, sexes réunis, de 2001

Mise à jour : Juin 2010