




OBSERVATOIRE POPULATIONNEL

Définition :

- 1) Taux ajusté d'incidence par cancer de la prostate pour 100 000 habitants : rapport pour une période donnée, du nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate, à la population totale au milieu de la même période, ajusté selon la structure de l'âge de la population.
- 2) Taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate, soit le rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès pour cancer de la prostate pour 100 000 habitants, ajusté selon la structure d'âge de la population.

Principales causes de mortalité (1995-1999 et 2000-2005) Taux ajusté de mortalité, cancer de la prostate


Évolution du taux ajusté d'incidence du cancer de la prostate (pour 100 000) selon le territoire, 1997-2001 et 2001-2005



Constat :

La comparaison des taux d'incidence et de mortalité par cancer de la prostate suggère une létalité plutôt faible (comparativement au cancer du poumon notamment) dans la mesure où le taux d'incidence est autour de quatre fois plus élevé que le taux de mortalité.

Évolution du taux ajusté de mortalité cancer de la prostate, selon le territoire, 1995-1999 et 2000-2005 (Taux annuel moyen pour 100 000)



Taux ajusté d'incidence :

Au CSSS, pour la période 2001-2005, le taux ajusté d'incidence du cancer de la prostate est plus élevé qu'à Montréal. C'est également le cas à Montréal-Nord, comparativement à Achunsiac.

Évolution entre les périodes :

L'évolution du taux ajusté d'incidence du cancer de la prostate, entre les périodes 1997-2001 et 2001-2005, révèle une tendance à la baisse dans tous les territoires de comparaison. Aucune différence statistiquement significative au seuil de 0,05, suggérant que les taux demeurent relativement comparables entre les territoires de comparaison.

Taux ajusté de mortalité :

Le taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate durant la période 2000-2005 est supérieur au CSSSAM-N comparativement à Montréal. Il est également plus élevé à Montréal-Nord qu'à Achunsiac. Les taux ne sont cependant pas significativement différents au seuil de 0,05, suggérant que les taux se comparent entre les territoires de comparaison.

Évolution entre les périodes :

Entre les périodes 1995-1999 et 2000-2005, le taux ajusté de mortalité par cancer de la prostate a baissé dans tous les territoires de comparaison (Montréal, Montréal-Nord et Achunsiac).

Fiche : 108 : PCM_cancer_prostate

Source : Fichier des décès et fichier des tumeurs, MSSSS, Service de développement de l'information. Carrefour montréalais d'information sociosanitaire (CMIS), Atlas Santé Montréal, ASSS.

Société canadienne du cancer, page Internet consultée le 11 juin 2010

Mise à jour : Juin 2010