Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et Montréal-Nord

Direction locale de santé publique et du développement des communautés

État de santé physique ITSS et MADO (2003-2009)
Situation épidémiologique, syphilis infectieuse

Définition : Taux d'incidence par 100 000 de la syphilis infectieuse en 2009 et évolution de 2003 à 2009.





Fiche : 166 : ITSS_Situation_épidémiologique_Syphilis (2003-2009)
Source : DSP, ASSS. Portrait local ITSS, CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord, version 27-09-2010.
DSP, ASSS. Situation épidémiologique des ITSS pour la région de Montréal et Fiche descriptive pour le CSSSAM-N, 2006.
Mise à jour : Octobre 2010

Taux d'incidence en 2009 :

En 2009, le taux d'incidence de la syphilis pour 100 000 personnes est presque trois fois plus élevé à Montréal qu'au CSSSAM-N. Le taux du CSSS le place au 6e rang parmi les 12 CSSS de Montréal. Ce taux correspond à 7 cas au CSSSAM-N : la grande majorité des cas résident à Ahuntsic. Un seul cas est déclaré à Montréal-Nord.

Selon le groupe d'âge et le sexe :

Au CSSSAM-N, les hommes sont beaucoup plus touchés par la syphilis infectieuse que les femmes. Ils sont tous âgés de 35 à 59 ans. Le seul cas féminin est âgé de 20 à 24 ans.

À l'échelle montréalaise, les HARSAH représentent 94 % des cas déclarés. Dans le cas des personnes ayant exclusivement des relations hétérosexuelles, les deux tiers sont des hommes. Parmi les cas déclarés chez les hétérosexuels, près de 60 % sont d'origine autre que canadienne-française ou anglaise.

Évolution dans le temps :

L'évolution de l'incidence de la syphilis entre 2003 à 2009 suggère une tendance, somme toute, à la hausse au CSSSAM-N, surtout quand on tient compte du fait que les taux masculins demeurent les plus élevés depuis 1996. À Montréal, on observe une diminution du taux en 2009.

Faits saillants : Le taux d'incidence de la syphilis infectieuse en 2009 est presque trois fois moins élevé au CSSSAM-N (n=7 cas) qu'à Montréal. La grande majorité des cas déclarés à Montréal sont des HARSAH, alors qu'on retrouve une minorité de personnes ayant des relations hétérosexuelles. Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'hommes, alors que parmi les hétérosexuels, on retrouve une majorité de personnes d'origine immigrante. Enfin, le taux d'incidence suit une tendance à la hausse surtout chez les hommes du CSSSAM-N.



*Le taux d'incidence en 2006 pour le CSSSAM-N concerne des cas exclusivement masculins. (taux calculé sur la population masculine du CSSSAM-N)

Notes :