Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et Montréal-Nord

Direction locale de santé publique et du développement des communautés

Habitudes de vie et comportements (2003)
Consommation d'alcool et de drogue chez les jeunes du secondaire





Fiche : 169 : HCV_Consommation_drogue_alcool (2003)
Source : Direction de prévention et de santé publique, ASSS. Objectif jeunes: comprendre soutenir, Rapport annuel 2004-2005, p.80-81, 2004-2005
Données de l'enquête EBJM 2003
Mise à jour : Octobre 2010

Définition : Pourcentage (%) de jeunes du secondaire (I, III et V) selon la consommation de drogue ou d'alcool en 2003 à Montréal.
Les données présentées proviennent de l'Enquête sur le bien-être des jeunes montréalais (EBJM, 2003).

Consommation d'alcool :

En 2003, l'EBJM révèle que le % des jeunes qui ont bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois à peu près chaque semaine augmente avec le niveau scolaire passant de 2 % en secondaire I à 21 % en secondaire V. Les jeunes déclarant consommer habituellement 5 verres ou plus par occasion (consommation excessive) sont près du tiers en sec. I et III et près de la moitié des jeunes en sec. V (données non présentées).

Consommation de drogue :

La proportion de jeunes ayant consommé du cannabis augmente avec le niveau scolaire. Cela étant, une majorité affirme n'en avoir jamais consommé ou juste une fois pour essayer.

Pour ce qui est de la consommation de drogues en général, les jeunes ayant déclaré en avoir consommé au moins une fois est de 10 % en secondaire I, 25 % en secondaire III et 47 % en secondaire V. Il n'y a pas de différence entre les sexes. Les drogues les plus utilisées sont le cannabis, suivies des hallucinogènes et des amphétamines.

Consommation d'alcool et de drogue :

La consommation d'alcool en même temps que des drogues (polyconsommation) augmente avec le niveau scolaire. À cet effet, on retrouve près de huit fois plus de jeunes de secondaire V que secondaire I dans cette catégorie de consommation.



Faits saillants : Selon l'EBJM en 2003, la consommation d'alcool chez les jeunes du secondaire à Montréal augmente avec le niveau scolaire. Le même phénomène s'observe pour la consommation de drogues. Les drogues les plus utilisées sont en premier lieu le cannabis suivi des hallucinogènes et des amphétamines. Enfin, la consommation simultanée d'alcool et de drogues est près de huit fois plus grande en secondaire V qu'en secondaire I; passant de 4 % à 31 %.

Notes :

•