



État de santé physique ITSS et MAD0 (2009) Situation épidémiologique des ITSS


Taux d'incidence pour 100 000 de la chlamydie génitale selon le groupe d'âge et le sexe, CSSSAM-N, 2009



Taux d'incidence pour 100 000 de l'infection gonococcique selon le groupe d'âge et le sexe, CSSSAM-N, 2009



Taux d'incidence pour 100 000 de l'hépatite C (statut non précisé) selon le groupe d'âge et le sexe, CSSSAM-N, 2009



OBSERVATOIRE POPULATIONNEL

Définition : Taux d'incidence des principales infections transmissibles par le sexe ou par le sang (ITSS) par 100 000 personnes de 15 ans et plus, en 2009 et évolution entre 2006 et 2009.

Chlamydia (chlamydie génitale) : Infection transmissible sexuellement la plus répandue en 2009. Le taux est près de trois fois plus élevé chez les femmes de moins de 35 ans comparativement aux hommes du même groupe d'âge. En 2009, l'incidence de la chlamydia est plus élevée à Montréal-Nord (231,3 pour 100 000) qu'à Ahuhtsic (218,2 pour 100 000). L'évolution du taux d'incidence de la chlamydia entre 2006 et 2009 suggère une croissance importante, alors que le CSSSAM-N se situe maintenant au 2^e rang parmi les 12 territoires de CSSS de Montréal.

Gonorrhée (infection gonococcique) : Le taux d'infection gonococcique varie selon le sexe et le groupe d'âge. Les moins de 30 ans tendent à être davantage affectés comparativement aux autres groupes d'âge, sauf en ce qui concerne les hommes de 45-49 ans. Enfin, l'évolution de l'incidence de la gonorrhée entre 2006-2009 suit une tendance à la hausse sur le territoire du CSSSAM-N.

Hépatite C : Le taux d'incidence de l'hépatite C* est plus élevé chez les hommes (41 pour 100 000) que chez les femmes (21). Les groupes d'âges les plus touchés chez les hommes sont les 35-49 ans et chez les femmes ce sont davantage les 40-59 ans. Ce taux est plus élevé à Ahuhtsic (40,1 pour 100 000) qu'à Montréal-Nord (21,2 pour 100 000). Enfin, l'évolution entre 2006 et 2009 du taux d'incidence de l'hépatite C suggère une tendance à la baisse.


Autres ITSS :

Syphilis infectieuse : Un taux d'incidence de 4,3 au CSSSAM-N (6^e rang des CSSS). La syphilis a touché 7 hommes en 2009. Le groupe d'âge le plus touché est les hommes de 35-39 ans. Le CLSC d'Ahuhtsic est plus touché (incidence : 7,5 contre 1,2 à Montréal-Nord). Enfin, l'évolution du taux d'incidence pour 100 000 entre 2006 et 2009 suit une tendance à la hausse.

Lymphogranulomatose vénérienne (LGV) : Une seule personne de sexe masculin a été touchée au CSSSAM-N en 2006. Aucun cas n'a été rapporté en 2009.

Hépatite B aiguë : Un seul cas d'hépatite aiguë au CSSSAM-N en 2009.

Évolution du taux (pour 100 000) d'infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS), 2006 à 2009, CSSSAM-N



Fiche : 171 : ESP ITSS_principales_2009 (2009)

Source : Situation épidémiologique des ITSS, Fiche descriptive pour le CSSSAM-N, (DSP, ASSSM) 2006 et 2009

Mise à jour : Octobre 2010