



### Utilisation des services de santé (2007-2008) Couverture vaccinale en milieu scolaire

#### Population ciblée pour la vaccination en milieu scolaire :

Sur le territoire du CSSSAM-N, on dénombre 57 écoles primaires et secondaires, privées, publiques et spécialisées, totalisant plus de 25 000 élèves au 30 septembre 2008. Les vaccins en milieu scolaire se donnent en 4<sup>e</sup> année du primaire et en secondaire III. Sur le territoire du CSSSAM-N, on dénombre quelque 1 350 élèves inscrits en 4<sup>e</sup> année du primaire en 2008-2009 soit 629 à Ahuhtsic et 725 à Montréal-Nord et 2 800 inscrits en secondaire III en 2007-2008, soit 1 134 à Ahuhtsic et 1 665 à Montréal-Nord.

#### La vaccination contre le Virus du papillome humain (VPH) :

Le virus du papillome humain (VPH) est la cause de cancers et de lésions précancéreuses du col de l'utérus et de la sphère anogénitale ainsi que des condyomes (ou verrues génitales). Il est acquis très tôt après le début des relations sexuelles et constitue l'infection transmissible sexuellement la plus fréquente avec une incidence cumulative qui dépasse les 70 % en Amérique du Nord. Depuis l'automne 2008, le Québec a implanté un programme de vaccination contre le VPH *Gardasil®* qui protège contre les types 6, 11, 16 et 18 (on dénombre 40 types de VPH). Nous n'avons pas actuellement de données sur le taux de vaccination. Cependant, le Programme de vaccination est offert gratuitement à l'école à toutes les filles de 4<sup>e</sup> année du primaire et du 3<sup>e</sup> secondaire. Par ailleurs, entre la 5<sup>e</sup> année du primaire et le 2<sup>e</sup> secondaire, les filles peuvent également recevoir le vaccin si elles ont des relations sexuelles. Le calendrier du Programme consiste en trois doses pour les filles de 4<sup>e</sup> année du primaire (0,6 et 60 mois).

**Fiche** : 188 : USS\_vaccins\_scolaires (2007-2008)

**Source** : MSSS (2008). Couverture vaccinale en milieu scolaire, saison 2007-2008. Bureau de surveillance et de Vigie, Direction générale de santé publique.

MSSS (2009). Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec. Année 2008 (et projections 2009).

CGTSIM (mars 2009) et compilation CSSSAM-N, 2009 (statistiques non publiées).

**Mise à jour** : Octobre 2010

**Définition** : Portrait de la couverture vaccinale en milieu scolaire au CSSSAM-N pour l'année 2007-2008.

#### Couverture vaccinale en milieu scolaire :


- En 2008, la proportion d'élèves ayant complété la vaccination contre l'hépatite B (trois doses) est de 82,3 % pour les élèves inscrits en 4<sup>e</sup> année. Ce pourcentage est le plus bas taux de couverture vaccinale depuis que le programme de vaccination en milieu scolaire existe. Il s'agit aussi de la 4<sup>e</sup> année consécutive où une baisse du taux de vaccination est observée.

- Parmi l'ensemble des 29 territoires de CLSC, celui qui occupe le 1<sup>er</sup> rang a obtenu un taux de couverture de 91,8 % pour 3 doses. Le secteur Ahuhtsic, pour sa part, occupe le 11<sup>e</sup> rang et le secteur Montréal-Nord, le 18<sup>e</sup> rang. En conséquence, jusqu'à 20 % de jeunes élèves sur le territoire du CSSSAM-N n'ont pas reçu tous les types et doses de vaccins.

- Par ailleurs, on estime à 90 % la proportion d'élèves de secondaire III sur le territoire ayant reçu les vaccins suivants en 2007-2008 (dCaT, Varivax III, diphtérie/tétanos, coqueluche, polio, rougeole, rubéole, oreillons, hépatite B, méningocoque et statut vaccinal complet pour l'âge). Ce qui veut dire qu'environ 10 % d'entre eux ne les ont pas encore reçus.

- Enfin, depuis septembre 2008, le CSSS a introduit au calendrier vaccinal le vaccin contre le VPH (Virus du papillome humain). Cette vaccination est administrée dans les classes de quatrième années du primaire. Afin d'immuniser le plus grand nombre, un calendrier de rattrapage a été prévu et le vaccin contre le VPH est donné aux jeunes filles de secondaire III jusqu'en 2012-2013. Il est à noter cependant que depuis 2008, on utilise le vaccin *TwinRix®* contre l'hépatite A et B qu'on administre en deux doses.

#### Couverture vaccinale (%) contre l'hépatite B (3 doses) en 4<sup>e</sup> année selon le territoire, 2007-2008



**Faits saillants** : En 2008, il y a plus de 25 000 élèves sur le territoire du CSSSAM-N. Les vaccins en milieu scolaire se donnent en 4<sup>e</sup> année du primaire et en secondaire III. Le plus bas taux de couverture vaccinale pour l'hépatite B (3 doses) a été enregistré en 4<sup>e</sup> année du primaire. Depuis 4 ans ce taux ne cesse de diminuer. Jusqu'à 20 % des élèves du territoire n'ont pas reçu tous les types et doses de vaccins. Enfin, depuis septembre 2008 le vaccin contre le VPH est donné aux jeunes filles de secondaire III jusqu'en 2012-2013.

#### Notes :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---