




OBSERVATOIRE POPULATIONNEL


**État de santé physique  
(ITSS et MADO) Infection par le virus de  
l'hépatite C (VHC) selon certaines  
caractéristiques, année 2009**

**Définition :** Taux (%) d'incidence et nombre (N) de cas d'infection par le virus de l'hépatite C selon certaines caractéristiques. Le VHC se transmet par l'exposition percutanée à du sang infecté; il est à noter que la transmission sexuelle est possible quoique rare. Au Québec, le principal mode de transmission du VHC est le partage de matériel d'injection\*.


Taux (%) d'incidence et nombre (N) de cas  
d'infection par le virus de l'hépatite C selon  
les territoires, 2009




Taux (%) d'incidence de l'infection par le virus de  
l'hépatite C selon le sexe et le territoire  
du CSSSAM-N, 2009



Taux (%) d'incidence de l'infection par le virus  
de l'hépatite C selon le groupe d'âge et  
le territoire du CSSSAM-N, 2009



Taux (%) d'incidence de l'infection par le virus  
de l'hépatite C sur le territoire du CSSSAM-N  
selon les facteurs de risque, 2009



**Faits saillants :** D'abord, en 2009, sur le territoire du CSSSAM-N, on estime à 30,4 % le taux d'incidence de l'infection par le virus de l'hépatite C (21,2 % à Montréal-Nord et 40,1 % à Ahuntsic) contre 39 % à Montréal. Par ailleurs, les hommes ainsi que les personnes âgées de 40 à 59 ans composent la majorité des cas de l'hépatite C, sur le territoire du CSSSAM-N. Finalement, parmi les facteurs de risque, le milieu de l'incarcération arrive au 1<sup>er</sup> rang suivi de la consommation de drogue par voie nasale.